

ASSOCIAZIONE SINDACI DEL ROERO E COLLINE ALFIERI

FLAVESCENZA DORATA

TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2017
contro *Scaphoideus titanus*

**Primo trattamento insetticida per le aziende convenzionali da :
tra il 24 ed il 28 giugno**

AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA (che aderiscono all'operazione 10.1.1 del PSR 2104-2020)
ACETAMIPRID, CLORPIRIFOS ETILE, CLORPIRIFOS METILE, ETOFENPROX, THIAMETHOXAM

INSETTICIDI CONSIGLIATI IN QUESTO PERIODO:

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)
Etofenprox	Fenossibenzil eteri	14
Clorpirifos etile	Fosfororganici	30
Clorpirifos metile	Fosfororganici	15
Acetamiprid	Neonicotinoidi	14
Thiamethoxam	Neonicotinoidi	21

NOTA: PER IL PROSSIMO INTERVENTO SARA' NECESSARIO UTILIZZARE UN P.A. DIVERSO DA QUELLO IMPIEGATO PER QUESTO TRATTAMENTO.

**La Flavescenza dorata della vite si previene solo se:
dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore)
si estirpano le piante malate e si eliminano i tralci con sintomi: questo serve per
togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).**

Salvaguardia degli insetti pronubi

(Legge regionale 3/8/98, n. 20)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.
- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione;
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.